

Legende

Galmeifluren, Magerrasen und Halden

- Galmeiflur: Grasnelken-Ges. (Armenietum halleri), typ. Ausbildung
- Faule Aue: Ausbildung der Galmeiflur (Armenietum halleri) - Ausbildung mit Scheidenwollgras
- Vegetationsmosaik mit Elementen der Galmeiflur
- Pfeifengras-Fazies auf wechselfeuchten Haldenbereichen
- Borstgras-Magerrasen (Nardetalia-Basalgemeinschaften)
- Nardetalia-Basalgemeinschaften mit Pfeifengrasfazies
- Zwergstrauchreiche Berghalden (Vaccinio-Callunetum): Aust. mit Heidekraut trocken/feucht
- skeltreiche Halden, vegetationsfrei oder vegetationsarm
- feinsandige Halden, vegetationsfrei oder vegetationsarm
- Zusatzsignatur für Rekultivierungsfächen mit Kirschenmispeldeckung

Wirtschaftswiesen und Weiden

- Rotschwingel-Strauflgras-Gemeinschaft
- Rotschwingelweide (Festuco-Cynosuretum): frische Aust. - feuchte Aust. - II -
- Wiedelgras-Feldweide (Lolio-Cynosuretum)
- Frauenmantel-Berg-Glatthaferwiese (Alchemillo-Armenietum elatioris)
- Feuchte Berg-Glatthaferwiese, Aust. mit Wasservotrich (Polygonum bistorta)
- Molinio-Armenetalia-Basalgemeinschaft
- Waldbrunnen-Feuchtwiese (Crepidio-Juncetum scutellorum)
- Waldbrunnen-Feuchtwiese (Scirpetum sylvaticum)
- Fadenbrunnen-Feuchtwiese (Juncetum filiformis - Gesellschaft)
- Baldrian-Mädesüß-Flur und staudenreiche Feuchtwiesenbrüche
- Scheidenwollgras-Pfeifengrasgesellschaft (Eriophorum vaginatum - Molinia caerulea-Gesellschaft)
- feuchte Brachen
- frische oder trockene Brachen
- kurzlebige und ausdauernde Ruderalfluren

Röhrichte, Fließ- und Grubengewässer

- Schilfröhricht (Phragmites australis)
- Breitblattröhrlinden-Röhricht (Typhetum latifoliae)
- Rohrgras - Röhricht (Phragmites australis)
- Kleinhöhrlinden (unbestimmt)

- Zäun-Sumpfsimsen-Röhricht (Eleocharitetum maritima)
- Schnabelseggenried (Carex rostrata)
- Fuchssaggenried (Carex vulpina - Bestand)
- Schwimmblattdecke, zumeist mit Schwimmenden Lärchen und Gelbe Teichmumie
- Bachlauf, Graben
- Teich
- temporäres Gewässer

Wald- und Gehölzgesellschaften

- Einzelbaum, Baumgruppe, Allee
- Einzelbaum: Birke, Eiche, Fichte, Kiefer
- Einzelbaum: Erle, Lärche, Rotbuche, Ahorn
- zweigstrauch- und krautreiche Wälder (oftmals Sukzessionsflächen auf Halden)
- naturnaher Hainbuchen - Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
- naturnaher Eichenmischwald
- bachbegleitender Schwarzerlenwald bzw. -galerie
- krautreicher Erlensumpf (Alnus glutinosa)
- feuchter Birkenwald
- Erlenauflistung (oftmals Grauerle)
- torfmoos- und klemsseggenreicher Erlen-Birkenbruch (Sphagno-Ainetum glutinosae)
- einstufige Fichten-Altersklassenbestände
- jüngere Fichten (-bestände), bis etwa 30-40 Jahre
- Fichten-Nadelmischwald mit reicher Zwergstrauchschicht (Vaccinio-Piceetum)
- Orcheneidengebüsch
- niedrige Hecken auf trockenen oder frischen Böden
- mehrstufige höhere Baumhecken mit Zusatzsymbol für dominante Baumarten
- Schlagflur-Stadlen mit Himbeeren, Brombeeren, Holunder u. Weidenröschen
- sonstige Signaturen
- asphaltierte und unbefestigte Wege
- NSG - Schild
- NSG - Grenze
- Info-Tafel

