


Abb. 40: Lage der Aufnahmeorte der Vegetationsaufnahmen

Feldaufnahmen 1992 u. 1993 der  
Biologische Station Rothargebilde

Lage der LÖLF-Dauermarkierungsflächen (Vegetation)

1. Fettweide,
2. Rotschwengel-Magerweide
3. Waldbinsen-Feuchtwiede
4. Frauenmantel-Glatthaferwiese
5. Hochstaufenflur

- Biotopmanagementplan NSG Gernsdorfer Weidekämpfe -  
Maßstab 1 : 5000



**LEGENDE**

- A Amsel
- B Buchfink
- Be Bekassine
- Bk Braunkehlchen
- Bp Baumpieper
- Dg Dorngrasmücke
- F Fitis
- Fl Feldlerche
- Gg Gartengrasmücke
- G Goldammer
- He Heckenbraunelle
- Hm Haubenmeise
- K Kohlmeise
- Kg Klappergrasmücke
- Ku Kuckuck
- Mg Mönchsgrasmücke
- Mi Misteldrossel
- Nt Neuntöter
- Rt Ringeltaube
- Ro Rotkehlchen
- Si Singdrossel
- Tm Tannenmeise
- W Wiesenpieper
- Wb Waldbaumläufer
- Wg Wintergoldhähnchen
- Wl Waldbaubsänger
- Wm Weidenmeise
- Wo Waldohreule
- Zi Zilpzalp
- Zk Zaunkönig

Biologische Station Rothaargebirge	
Maßnahme	
Pflegeplan NSG Gernsdorfer Weiden	
Brutvogelerfassung 1992	
BEARBEITET VON Arthur Franz	Maßstab: 1:5000
	Abb. 41:
Erndtebrück, den 14.10.'92	




Abb. 38: Vorhandene Baumartenverteilung  
im NSG Gernsdorfer Weidekämpfe  
und Lage der Waldabteilungen  
Stand: 1.10.1992 (LÖLF,  
Abt. 5: Forsteinrichtung)

Maßstab 1 : 5000

### Zeichenerklärung

- Waldenteilung**
- 1 Abteilung
  - A Unterabteilung (Holzboden)
  - a Saumgehölze und Gehölzstreifen
- Baumartengruppen**
- über 1-40 41-80 81 Jahre
- Eiche
  - Buche
  - andere Laubbäume mit hoher Umtriebszeit (ALH)
  - andere Laubbäume mit niedriger Umtriebszeit (ALN)
  - Pappel
  - Kiefer
  - Lärche
  - Fichte
  - Douglasie
- Darstellung der Endnutzungsbestände**
- Endnutzung 1. Jahrzehnt
  - Teilendnutzung 1. Jahrzehnt
  - Loslieb, Freihieb
- Mehrschichtenbestände**
- Behandlungsschwerpunkt Jungwuchs mit Altholz
  - Behandlungsschwerpunkt Altholz mit Jungwuchs
- Eingemischte Baumarten**
- 10-20%
  - 21-40%
  - ab 41%







Sportplatz

Schützen-  
halle

Schneest.

2(2)

zu E

H

G

E

Esche Bruch

N.S.G. GERNSDORFER WEIDEKÄMPE

Glöckners Hahn

D

C

1

a

B

A

Hartmerich



Abb. 39: Standorttypenkarte der Waldflächen  
im NSG Gernsdorfer Weidekämpfe  
(LÖLF, Abt. 5: Forsteinrichtung)

Maßstab 1 : 5000

### Zeichenerklärung

#### Standorttyp



Hainsimsen-Buchenwald auf  
frischem Schiefergebirgslehm



Hainsimsen-Buchenwald auf  
staufrischem Schiefergebirgslehm



Hainsimsen-Buchenwald auf  
mäßig frischem Schiefergebirgslehm




Rasenschmielen-Buchenwald auf  
mäßig wechselfeuchtem Schiefergebirgslehm




Eichen/Buchenwald auf  
wechselfeuchtem Schiefergebirgslehm



Bach-Erlenwald







34,4

34,2

5634  
5634

33,1

33,1

33,1

33,1