

-Seltene Farn- und Blütenpflanzen:
Vorwarnliste

- ▲ Fundort 1999
- Fundort 1986, 1998 nicht mehr bestätigt
- Fundort 1998
- Fundort 1986, 1998 bestätigt
- Weg
- Bach
- Permanente Gewässer
- Temporäre Gewässer
- Heidebadbecken
- Gebäude
- Gärten und Sportanlagen
- NSG

Die Häufigkeitsangaben der Fundorte 1998 wurden 1999 aktualisiert.

BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER
Vogelsang 2
42653 Solingen
Telefon 0212-2542727
Telefax 0212-2542728
Stand: 1999

0 100 200 Meter

- As Agrostis vinealis (Sand-Straußgras)
- Ca Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)
- Cc Carex canescens (Grau-Segge)
- Cd Carex demissa (Aufsteigende Gelb-Segge)
- Cov Carex leporina (Hasenpfoten-Segge)
- Cn Carex nigra (Braune Segge)
- Cr Carex rostrata (Schnabel-Segge)
- Cv Calluna vulgaris (Besenheide)
- Ep Eleocharis palustris (Gemeine Sumpfsimse)
- Et Erica tetralix (Echte Glockenheide)
- Hy Hydrocotyle vulgaris (Wassernabel)
- Jb Juncus bulbosus (Zwiebel-Binse)
- Ms Myosotis stricta (Sand-Vergißmeinnicht)
- Pb Polygonum bistorta (Wiesen-Knöterich)



1:5000