

# Seltene Farn- und Blütenpflanzen: Gefährdungskategorie 3 und 4

- ▲ Fundort 1999 neu
- Fundort 1986, 1998 nicht mehr bestätigt
- Fundort 1998 neu
- Fundort 1986, 1998 bestätigt
- Weg
- Bach
- ↑ Fließrichtungspfeile
- Permanente Gewässer
- Temporäre Gewässer
- Heidebadbecken
- Gebäude
- Gärten und Sportanlagen
- NSG

Die Häufigkeitsangaben der Fundorte 1998 wurden 1999 aktualisiert

BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER  
Vogelsang 2  
42653 Solingen  
Telefon 0212-2542727  
Telefax 0212-2542728  
Stand 1999

0 100 200 Meter

- Bs Blechnum spicant (Rippenfarn)
- Cae Carex elata (Steife Segge)
- Ce Carex echinata (Igel-Segge)
- Co Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)
- Cp Carex panicea (Hirse-Segge)
- Cpu Cerastium pumilum (Dunkles Zwerg-Hornkraut)
- Cve Carex vesicaria (Blasen-Segge)
- Dm Dactylorhiza maculata (Geflecktes Knabenkraut)
- Dr Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)
- Ea Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras)
- Fm Filago minima (Zwerg-Filzkraut)
- Jm Jasione montana (Berg-Sandknöpfchen)
- Js Juncus squarrosus (Sparrige Binse)
- My Myrica gale (Gagel)
- Na Narthecium ossifragum (Beinbrech, Gelbe Moorlilie)
- Os Osmunda regalis (Königsfarn)
- Sm Scutellaria minor (Kleines Helmkraut)
- Th Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)
- Vd Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian)
- Vp Viola palustris (Sumpf-Veilchen)



1:5000