



- Quellfluren**
- Winkelseggen-Quellflur (*Caricetum remotae*)
- Feuchtpionier- und Röhricht**
- Feuchtpionier- und Röhricht
 - Teich-Röhricht
 - Teich-Röhricht
- Schuttfuren und Felsrasen**
- Ruprechtskaut-Schuttfur
 - Sandkressen-Steinschuttfur
 - Felsflur der Kaukasischen Gänsekresse
 - Mauerkräuter-Felsflur
 - Blaugras-Felsrasen
- Trocken-warme Ruderalfluren und Pionier-Halbtrockenrasen**
- Möhren-Bitterkraut-Fluren (*Daucus-Picridetum hieracoides*)
 - Plattkalm (*Poa compressa*) - Initialstadium
 - Baldrian (*Thymus pulegioides*) - Ausbildung
 - schwermetallhaltige Baldrian-Ausbildung
 - typische Ausbildung
 - stickstoffreiche Ausbildung
 - Huflattich-Fluren (*Poa-Tussilaginetum farfarae*)
 - kennartennaher Glatthafer - Bestand
 - Waldreben-Schleier
 - Rainfarn-Beifuß-Gesellschaft (*Tanacetum-Artemisietum vulgaris*)
 - Pionierfluren des Roten Straußgrases
- Galmefluren und Heidefragmente**
- Galmeflur (*Violetum calaminariae achilietosum*)
 - Galmeflur (*Violetum calaminariae callunetosum*)
 - Galmeflurfragment
 - Zwergstrauchheide- und Borstgrasflur-Fragment
 - Binsen-Pfeifengrasflur (*Juncus-Molinietum*)
- Nährstoffreiche Säume und Staudenfluren**
- Zwergulmer-Gesellschaft (*Heracleo-Sambucetum ebuli*)
 - Kleblattkraut-Brennnessel-Fluren
- Schlagfluren, Gestrüppe und Gebüsche**
- Adlerfarn-Bestand
 - Sandrohr-Bestand
 - Tollkirschen-Schlagflur (*Atropetum belladonnae*)
 - Brombeer-Gestrüpp
 - Besenginster-Gebüsch
 - Salweiden-Gestrüpp (*Lonicero-Salicetum capreae*)
 - Hartnagel-Gebüsch (*Coma-Prunetum*)
 - Schlehen-Weißdorn-Gebüsch (*Coma-Prunetum*)
 - Berberitzen-Gebüsch (*Ligustro-Prunetum*)
 - Hundsrosen-Sanddorn-Gebüsch
- Vorwälder und Wälder**
- Birken-Vorwald
 - Feldahorn-Vorwald
 - Kiefern-Vorwald
 - Hainmieren-Erlenauwald (*Stellario-Alnetum*)
 - Stieleichen-Albestand
 - Pfeifengras-Eichen-Birkenwald (*Betulo-Quercetum molinietosum*)
 - Seggen-Buchenwald (*Carici-Fagetum*)
 - Eichen-Hainbuchenwald (*Stellario-Carpinetum*)
 - Eisbeeren-Eichen-Hainbuchenwald (*Gallio sylvatici-Carpinetum*)
- Forste**
- Nadelforste (F = Fichte, K = Kiefer u. L = Lärche)
 - Laubforste (Ba = Bergahorn, B = Buche, E = Esche, El = Stieleiche, Ge = Grauerle, P = Pappel, R = Robinie, Ro = Roteiche, Sa = Spitzahorn und Se = Schwarzerle)
- Acker- und Grünlandgesellschaften**
- Ackerfarnmantel-Kamillen-Brache u. Benjes-Hecke (Neuanlage)
 - Glatthafer-Wiesenbrache (*Arrhenatheretum elatioris*)
 - Fettweidenbrache (*Lolium-Cynosuretum*)
 - Rotschwingel-Weidenbrache u. -Auflassungsstadien
- Sonstiges**
- Teich (Neuanlage)
 - Quelle
 - Nummer der Vegetationsaufnahme

Kreis Aachen · Untere Landschaftsbehörde

Pflege- und Entwicklungsprotokoll
"NSG Steinbruchbereiche Bernhardshammer / Binsfeldhammer"

Karte III

Reale Vegetation

Bearbeitung
Paulson
+ Raskin
Büro für Landschaftsökologie

entworfen
gezeichnet
geprüft

RR
AW
RR
Datum
August 1998

Maßstab
1:2.500